



Vivir con esta afección podría resultar abrumador, pero puede hacer cosas que le ayuden a sobrellevarla.

Aunque no se ha comprado que una dieta específica disminuya el desarrollo de quistes en las personas con esta afección, la dieta y el ejercicio ayudan a bajar su presión arterial, lo que ayuda a desacelerar el daño al riñón. Además, se ha demostrado que alcanzar y mantener un peso saludable puede ayudar a reducir el progreso de esta afección. Explore como la dieta, el ejercicio y el estilo de vida pueden ayudarle a mejorar su salud en general.

Dieta

Menos sodio

Comer alimentos con alto contenido de sal podría aumentar su presión arterial.^{3,4}

- Limite su consumo de sodio a menos de 2,300 miligramos diarios. Algunas personas, incluidas aquellas con enfermedad renal, pueden necesitar consumir menos de 1,500 mg/día.
 Verifique con su proveedor de cuidados de salud para recomendaciones específicas.¹¹
- Evite alimentos congelados y ya preparados, o escoja opciones etiquetadas con «bajo en sodio».^{3,4} Sin embargo, tenga cuidado con los alimentos bajos en sodio y lea las etiquetas cuidadosamente porque muchos de estos productos contienen cloruro de potasio como sustituto. Este podría resultar perjudicial si tiene una dieta restringida en potasio.⁵
- Verifique las etiquetas detenidamente y tenga en mente la sal «escondida» en las sopas y caldos enlatados, pan, cereal, cortes fríos y aderezo para ensaladas.⁴

- Escoja alimentos con un valor diario de sodio por debajo del 10%.6
- Cocine en casa cuando sea posible, y reemplace la sal con hierbas, especias y otros sazonadores sin sal.^{3,4}

Menos cafeína

La cafeína puede actuar como diurético, haciendo que usted pierda más agua.⁷

- Limite la cantidad de café y té que toma.⁷
- Evite las bebidas energizantes.7

Métodos dietéticos para detener la hipertensión

Este plan de alimentación, conocido como DASH por sus siglas en inglés, se basa en **2,000 calorías al día**. Las porciones diarias de cada grupo de alimentos pueden variar dependiendo de sus necesidades calóricas.

Esta publicación es únicamente para fines informativos. No tiene por objeto sustituir los consejos, diagnósticos o tratamientos médicos profesionales. Siempre busque el consejo de su médico u otro proveedor de servicios de salud calificado si tiene alguna pregunta sobre una afección médica. Nunca ignore el consejo de los profesionales médicos ni posponga pedirlo por algo que haya leído en esta publicación. Si cree que tiene una emergencia médica, llame a su médico o al 911 de inmediato. AllianceRx Walgreens Pharmacy no recomienda ni avala ninguna prueba, médico, producto, intervención, opinión ni demás información específica que pueda haberse mencionado en esta publicación. Cualquier uso que hagas de la información provista en esta publicación es solo bajo tu propio riesgo.

Esta publicación fue elaborada por y se brinda como un servicio de AllianceRx Walgreens Pharmacy.

Consejos para adoptar el plan de alimentación DASH

- Cambie su alimentación poco a poco.
 Añada una porción de vegetal o fruta en el almuerzo y cena.
- Use solo la mitad de la mantequilla o margarina que usa ahora.
- Si tiene problemas para digerir los productos lácteos, trate las píldoras o gotas de enzima lactasa (disponibles en farmacias y supermercados), o compre leche sin lactosa o con enzima lactasa añadida.
- Obtenga nutrientes adicionales como las vitaminas B escogiendo comidas de granos integrales, incluyendo pan o cereales integrales.
- Divida las porciones. Coma dos porciones de frutas y/o vegetales con cada comida, o añada frutas como meriendas.
- Trate la carne como una parte de la comida, en vez del foco principal. Pruebe guisos, pasta y platillos salteados. Evite comer carnes en dos o más comidas por semana.
- Use frutas o comidas bajas en grasa como postres y meriendas.

Plan de alimentación DASH8

Grupo alimenticio	Porciones diarias
Granos	6-8
Vegetales	4-5
Frutas	4-5
Productos lácteos bajos en grasa o sin grasa	2-3
Carnes, aves y pescado	6 o menos
Frutos secos o nueces, semillas, frijoles secos y guisantes	4-5 por semana
Grasas y aceites	2-3
Dulces	5 o menos por semana
Sodio	2,300 mg*

*Consumir 1,500 mg de sodio al día en vez de 2,300 mg puede ayudar a reducir aun más la presión arterial.

Verifique con su médico si DASH es lo indicado para usted y consulte a un nutricionista registrado para personalizar un plan de alimentación específico para sus necesidades.⁷

Ejercicio

- Verifique con su proveedor de cuidados de salud antes de comenzar a hacer cualquier actividad física nueva para estar seguro que es apropiada para usted.⁴
- Ejercicio moderado como caminar puede ayudar a bajar la presión arterial y los niveles de estrés, especialmente cuando lo hace acompañado de una amistad.³
- Haga unos 30 minutos de ejercicio de moderado casi todos los días de la semana. Si es demasiado de golpe, trate de dividir la actividad en tres bloques de 10 minutos.⁴
- Evite actividades en las que los riñones pudieran recibir golpes accidentales, como deportes de contacto, y cualquier cosa que incluya impacto repetitivo como montar a caballo, fútbol americano o balompié.⁹

- Tenga cuidado con los ejercicios vigorosos y el calor extremo, esto podría aumentar el riesgo de deshidratación.⁹
- Incorpore la actividad física en su rutina diaria:⁴
 - · Use las escaleras en vez del elevador.
 - Pasee al perro en vez de dejarlo correr en el patio.
 - Bájese del autobús o del tren una o dos paradas antes.
 - Escoja un lugar de estacionamiento alejado de su destino.

Ejemplos de actividades físicas moderadas^{9,10}

Tareas comunes

- Lavar y encerar un auto por 45-60 minutos
- Lavar ventanas o pisos por 45-60 minutos
- Hacer jardinería por 30-45 minutos
- Empujarse a sí mismo en una silla de ruedas por 30-40 minutos
- Empujar un coche infantil 1.5 millas en 30 minutos
- Rastrillar hojas por 30 minutos
- Palear nieve por 15 minutos
- Subir o bajar escaleras por 15 minutos

Actividades deportivas

- Jugar voleibol por 45-60 minutos
- Jugar futbol de toque por 45 minutos
- Caminar 2 millas en 30 minutos (1 milla en 15 minutos)
- Tirar el balón al canasto por 30 minutos
- Correr bicicleta 5 millas en 30 minutos
- Bailar rápido (socialmente) por 30 minutos
- · Hacer aeróbicos acuáticos por 30 minutos
- Nadar vueltas por 20 minutos
- Jugar baloncesto por 15-20 minutos
- Saltar cuica por 15 minutos



Estilo de vida

- Fumar podría aumentar la presión arterial, así que trate de dejarlo. Pruebe con ayudas de venta libre o pídale consejo a su proveedor de cuidados de salud.^{1,11}
- Trate la meditación, esto podría ayudarle a relajar su cuerpo y mente para reducir el estrés. 12
- Tome suficiente agua (2 a 3 litros diarios), según lo recomendado por su proveedor de cuidados de salud.¹¹
- Evite o limite el alcohol a no más de 1 trago por día.3
- Mantenga un peso saludable para reducir el riesgo de presión alta y disminuir la progresión de la enfermedad renal poliquística.^{6,7}

Índice de Masa Corporal (IMC)

El IMC y la circunferencia de la cintura pueden ayudarle a determinar si está sobrepeso. Un IMC de 25 o más se considera sobrepeso. Una medida de la cintura mayor de 35 pulgadas para las mujeres y de 40 pulgadas para los hombres se considera alta y puede llevar a tener presión alta.^{1,2}

Esta tabla muestra el IMC para varias estaturas y pesos.* Para usar la tabla, encuentre su estatura en la columna izquierda. Busque su peso a la derecha. El número al tope de la columna es el IMC para su estatura y peso.

IMC	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estatura (pies/pulg.)	Peso corporal (libras)										
4' 10"	100	105	110	115	119	124	129	134	138	143	148
5' 0"	107	112	118	123	128	133	138	143	148	153	158
5' 2"	115	120	126	131	136	142	147	153	158	164	169
5' 4"	122	128	134	140	145	151	157	163	169	174	180
5' 6"	130	136	142	148	155	161	167	173	179	186	192
5' 8"	138	144	151	158	164	171	177	184	190	197	203
5' 10"	146	153	160	167	174	181	188	195	202	209	216
6' 0"	154	162	169	177	184	191	199	206	213	221	228
6' 2"	163	171	179	186	194	202	210	218	225	233	241
6' 4"	172	180	189	197	205	213	221	230	238	246	254

^{*} El peso se mide en ropa interior sin zapatos.

Referencias

- Nowak KL, You Z, Gitomer B, et al. Overweight and Obesity Are Predictors of Progression in Early Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease. J Am Soc Nephrol. 2018;29(2):571-578. doi:10.1681/ ASN.2017070819
- 2. Smith T. Study looks at weight loss to manage dangerous hereditary kidney disease. Sitio web de UC Health Today. Publicado el 23 de enero de 2019. Accedido el 7 de marzo de 2023. https://www.uchealth.org/today/study-looks-at-weight-loss-tomanage-dangerous-hereditary-kidney-disease
- 3. National Kidney Foundation of Michigan. Polycystic Kidney Disease. Sitio web de National Kidney Foundation of Michigan. Accedido el 7 de marzo de 2023. https://nkfm.org/conditions/polycystic-kidney-disease/
- 4. Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. Your Guide to Lowering Blood Pressure. Sitio web de Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. Accedido el 7 de marzo de 2023. https://www.nhlbi.nih.gov/files/docs/public/heart/hbp_low.pdf
- 5. Hot topics: How much sodium is safe for kidney patients? Sitio web de National Kidney Foundation. Publicado el 5 de enero de 2022. Accedido el 7 de marzo de 2023. https://www.kidney.org/newsletter/hot-topics-how-much-sodium-safe-kidney-patients
- 6. National Kidney Foundation of Michigan. Your Guide to the New Food Label. Sitio web de National Kidney Foundation. Accedido el 7 de marzo de 2023. https://www.kidney.org/atoz/content/foodlabel

- 7. Carriazo S, Perez-Gomez MV, Cordido A, et al. Dietary Care for ADPKD Patients: Current Status and Future Directions. Nutrients. 2019;11(7):1576. Publicado el 12 de julio de 2019. doi:10.3390/nu11071576
- 8. National Heart, Lung and Blood Institute. DASH Eating Plan. Sitio web del Instituto Nacional del Corazón, Pulmón y la Sangre. Accedido el 7 de marzo de 2023. https://www.nhlbi.nih.gov/education/dash-eating-plan
- 9. PKD Charity. Diet and Lifestyle. Sitio web de PKD Charity. Accedido el 7 de marzo de 2023. https://pkdcharity.org.uk/about-adpkd/living-with-adpkd/diet-and-lifestyle
- 10. PKD Foundation. Lifestyle. Sitio web de PKD Foundation. Accedido el 7 de marzo de 2023. https://pkdcure.org/living-with-pkd/lifestyle/
- 11. National Organization for Rare Diseases. Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease. Sitio web de National Organization for Rare Diseases. Publicado en 2015. Accedido el 7 de marzo de 2023. https://rarediseases.org/rare-diseases/autosomal-dominant-polycystic-kidney-disease
- 12. RWJBarnabas Health. Polycystic Kidney Disease. Sitio web de RWJBarnabas Health. Accedido el 7 de marzo de 2023. https://www.rwjbh.org/treatment-care/kidney-care/conditions-treatments/polycystic-kidney-disease

5

